令和7年度 編入学個別学力試験問題

専門科目(90分)

(注意)

- ・指示があるまでは開けてはいけません。
- ・問題冊子はこの表紙を含めて3枚です。
- ・解答は解答用紙の指示された欄に横書きで記入しなさい。
- ・解答用紙は2枚です。配布されたすべての解答用紙に氏名と受験 番号を記入しなさい。
- ・解答用紙の得点欄には何も書いてはいけません。
- ・問題冊子、下書き用紙も回収します。持ち帰ってはいけません。

筑波大学医学群 看護学類

問題1 以下の文章を読み、設問に答えなさい。

大震災により山間部にある A 地区では、建物倒壊、土砂崩れなどによる多数の死傷者、行 方不明者のでる災害被害が発生した。発災直後、地域住民は小学校の体育館に身を寄せた。 A 地区は高齢者世帯の多い地区である。

- (1) 災害発生後の災害サイクルのうち、超急性期と亜急性期の定義と被災者の特徴、およびこの時期に必要な看護について説明しなさい。
- (2) 発災から2か月後、応急仮設住宅で生活を始めたA地区の被災者に生じやすい健 康被害の特徴とその看護について述べなさい。

問題2 以下の文章を読み、設問に答えなさい。

日本看護協会の「看護職の倫理綱領」(2021年)は、あらゆる場で実践を行う看護職を対象とした 16 の行動指針を示したものである。

(1) 「この部分は、著作権の都合により、公開できません」

(2) この2つの権利において、患者と家族の意見が対立した場合に、看護職はどのように支援する必要があるか、具体例をあげてあなたの考えを述べなさい。

令和7年度 編入学個別学力試験問題

小 論 文 (90分)

【注意】

- ・指示があるまでは開けてはいけません。
- ・問題冊子はこの表紙を含めて3枚です。
- ・解答は解答用紙の指示された欄に横書きで記入しなさい。
- ・解答用紙は3枚です。配布されたすべての解答用紙に氏名と受験 番号を記入しなさい。
- ・解答用紙の得点欄には何も書いてはいけません。
- ・問題冊子、下書き用紙も回収いたします。持ち帰ってはいけません。

筑波大学医学群 看護学類

以下の英文を読んで設問に日本語で答えなさい。

Many of the normal grief behaviors may seem like manifestations of depression. To shed some light on this, let's look at the debate about the similarities and differences between grief and depression.

中略

The main distinctions between grief and depression are these: In depression as well as grief, you may find the classic symptoms of sleep disturbance, appetite disturbance, and intense sadness. However, in a grief reaction, there is not the loss of self-esteem commonly found in most clinical depressions. That is, the people who have lost someone do not regard themselves less because of such a loss or if they do, it tends to be for only a brief time. And if the survivors of the deceased experience guilt, it is usually guilt associated with some specific aspect of the loss rather than a general, overall sense of culpability.

A section in the Diagnostic and Statistical Manual IV of the American Psychiatric Association suggests:

As part of their reaction to the loss, some grieving individuals present with symptoms characteristic of a Major Depressive Episode (e.g., feelings of sadness and associated symptoms such as insomnia, poor appetite, and weight loss). The bereaved individual typically regards the depressed mood as 'normal,' although the person may seek professional help for relief of associated symptoms such as insomnia or anorexia. [American Psychiatric Association, 1994, p. 299]

In this case, the bereaved generally regard their feelings of depression as normal, although they may seek professional help for some symptom relief.

Even though grief and depression share similar objective and subjective features, they do seem to be different conditions. Depression overlaps with bereavement but is not the same. Freud believed that in grief, the world looks poor and empty while in depression, the person feels poor and empty. These differences in cognitive style have been identified by Beck and other cognitive therapists who have suggested that the depressed have negative evaluations of a) themselves, b) the world, and c) the future. Although such negative evaluations can exist in the bereaved, they tend to be more transient.

中略

Jacobs and his colleagues at Yale have been interested in depression within the context of bereavement and have said, "Although the majority of depressions of bereavement are transient and

require no professional attention, there is growing appreciation that some depressions, especially those that persist throughout the first year of bereavement, are clinically significant." He has used antidepressant medication to treat several patients whose depression persisted late in the course of bereavement and did not resolve spontaneously or respond to interpersonal interventions. These were usually people who had a history of depression or some other mental health disorder. He found improvement in sleep disorders and appetite disturbance as well as an improvement in mood and cognition. This response suggests a biological dimension to the depression.

manifestation:兆候 self-esteem:自尊心 culpability:有責性 insomnia:不眠症 anorexia:食欲不振 subjective:主観的な overlap:重なる bereavement:死別 cognitive:認識力の transient:一時的な antidepressant:抗うつ剤 spontaneously:自然に interpersonal:人間関係の disturbance:混乱されること persist:持続する dimension:領域

出典:Grief Counseling and Grief Therapy, Third Edition, A Handbook for the Mental Health Practitioner. J. William Worden, 2002. Springer Publishing Company, Inc より抜粋(一部改変)

問題 1. 悲嘆と抑うつの類似点について簡潔に述べなさい。

問題 2. 遺族が示す悲嘆反応が病的な抑うつ症状とは異なる点について説明しなさい。

問題 3. 遺族が示す悲嘆行動や長引く抑うつについて、看護師はどのように注意を払う必要がある と考えますか。その理由を含めてあなたの考えを述べなさい。